

棘豆属一新变种

宗占江 何锡荣 刘 军 张俊成

A NEW VARIETY OF OXYTROPIS ANERTII NAKAI

Zong Zhan-jiang He Xi-rong Liu Jiu Zhang Jun-cheng

〔摘 要〕 本文发表了棘豆属一新变种, 即白花长白棘豆 *Oxytropis anertii* Nakai var. *albiflora* Zh. J. Zong et X. R. He var. nov.

关键词 棘豆属; 白花长白棘豆

Key words *Oxytropis*, *Oxytropis anertii* Nakai var. *albiflora*

白花长白棘豆 新变种

Oxytropis anertii Nakai var. *albiflora* Zh. J. Zong et X. R. He, var. nov.

Differt a typo floribus albis.

Jilin (吉林) Antuxian (安图县) Changbai Mountains (长白山) Heifengkou (黑风口)
alt. 2300 m, 20. VII. 1987. Zh. J. Zong (宗占江) 87501; *ibid.* 14. VII. 1990. X. R.
He (何锡荣) 90315 (Typus in INRCBMT. Conservatur).

花白花, 其它特征同原变种。生于高山冻原。分布于吉林省长白山。

本文作者单位: 吉林, 安图, 长白山自然保护区 (Institute of Natural Reserve Changbai Mountain Antu 133613 Jilin).

本项工作承蒙中科院沈阳应用生态研究所傅沛云研究员指导, 特此致谢。

1993年2月收到本文。